

## 14: 褥瘡推定発生率

|    |   |
|----|---|
| 分母 | 調査日の施設在院患者数   |
| 分子 | 入院時に褥瘡なく調査日に褥瘡を保有する患者数＋入院時に褥瘡あり他部位に新規褥瘡発生の患者数   |
| 備考 | 調査日は3ヶ月に1度とする。<br>原則として調査開始月の第2週の火曜日とする。  |
| 概要 | 褥瘡(床ずれ)は予防的ケアで防止することが重要です。ひとたび褥瘡が発生すると治りにくく、在院日数の延長や患者への苦痛を伴うことが多いため、患者への大きな負担となります。褥瘡が発生する危険因子を把握し、予防対策を行うことが重要で、本指標はその質を評価をする指標となります。 |

| 施設コード     | 調査開始日    | 調査終了日    | 分母数   | 分子数 | 割合      |
|-----------|----------|----------|-------|-----|---------|
| 210111438 | 20140401 | 20150331 | 1,893 | 43  | 2.27%   |
| 210111438 | 20150401 | 20160331 | 1,891 | 59  | 3.12%   |
| 210111438 | 20160401 | 20170331 | 1,921 | 38  | 1.98%   |
| 210111438 | 20170401 | 20180331 | 1,941 | 23  | 1.18%   |
| 210111438 | 20180401 | 20190331 | 2,037 | 18  | 0.88%   |
| 210111438 | 20190401 | 20200331 | 1,986 | 40  | 2.01%   |
| 210111438 | 20200401 | 20210331 | 1,740 | 26  | 1.49%   |
| 210111438 | 20210401 | 20220331 | 1,952 | 42  | 2.15%   |
| 210111438 | 20220401 | 20230331 | 1,702 | 24  | 1.41%   |
| 210111438 | 20230401 | 20240331 | 1,928 | 24  | 1.24%   |
| 210111438 | 20240401 | 20250331 | 1,829 | 28  | 1.53%   |
| 210111438 | 20250401 | 20260331 |       |     | #DIV/0! |

