

非がん性疾患

登録番号	レジメン名称	抗がん剤	投与量	単位	時間	手技	1コース	投与日	備考
14-001-02	間質性肺炎 CPA	エンドキサン	500	mg	30分	点滴	7日	day1	
14-002-02	絨毛性疾患MTX(30)	注射用メトレキセート	30	mg	医師指示	静注	12日	day1-5	
14-003-01	ANCA関連血管炎 CPA	エンドキサン	500~750	mg/m2	30分	点滴	21日	day1	
14-005-03	難治性ネフローゼ症候群 Rituximab(375)	リツキシマブ	375	mg/m2	備考参照	点滴	7日	day1	
14-006-02	TAM(一過性骨髄異常増殖症) AraC	シタラビン	備考参照	mg/kg	60分	点滴	7日	day1-7	・シタラビンの用量は以下の様にする。 早産児(35週未満)→0.5mg/kg/日 正期産児(35週以上)→1mg/kg/日
14-007-02	TAFRO症候群 Rituximab(375)	リツキシマブ	375	mg/m2	備考参照	点滴	7日	day1	・リツキシマブは最大500mg/回までとする。
14-008-03	難治性血栓性血小板減少性紫斑病 Rituximab(375)	リツキシマブ	375	mg/m2	備考参照	点滴	7日	day1	・リツキシマブは小児では最大500mg/回、それ以上の年齢では、500mg/回を超える事がある。
14-009-04	GPA・MPA Rituximab(375)	リツキシマブ	375	mg/m2	備考参照	点滴	7日	day1	以下小児用の記載 ・リツキシマブは最大500mg/body。
14-010-01	リウマチ性疾患 CPA	シクロホスファミド	500~1000	mg/m2	30分	点滴	28日	day1	
14-011-02	慢性特発性血小板減少性紫斑病 Rituximab(375)	リツキシマブ	375	mg/m2	備考参照	点滴	7日	day1	
14-012-02	天疱瘡 Rituximab(1000)	リツキシマブ	1000	mg	備考参照	点滴	14日	day1	
14-013-01	全身性強皮症 Rituximab(375)	リツキシマブ	375	mg/m2	備考参照	点滴	7日	day1	