

胃がん

| 登録番号 | レジメン名称 | 抗がん剤 | 投与量 | 単位 | 時間 | 手技 | 1コース | 投与日 | 備考 |
|-----------|---|-------------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|------|-------------------------|--|
| 03-005-02 | 胃がん CDDP(80)/CPT-11(70) | イリノテカン シスプラチン | 70 80 | mg/m ² mg/m ² | 90分 2時間 | 点滴 点滴 | 28日 | day1.15 day1 | |
| 03-006-05 | 胃がん 35日 CPT-11(80) / TS-1(80) | ティーエスワン イリノテカン | 80 80 | mg/m ² mg/m ² | | 内服 点滴 | 35日 | day1-21 day1.15 | ・TS-1の投与量は、体表面積に応じて以下のとおりとする。 体表面積 1.25m ² 未満:40mg/回 1日2回 体表面積 1.25m ² 以上~1.50m ² 未満:50mg/回 1日2回 体表面積 1.50m ² 以上:60mg/回 1日2回 |
| 03-007-02 | 胃がん DTX(40)/TS-1(80) | ティーエスワン ドセタキセル | 80 40 | mg/m ² mg/m ² | | 内服 点滴 | 21日 | day1-14 day1 | ・TS-1の投与量は、体表面積に応じて以下のとおりとする。 体表面積 1.25m ² 未満:40mg/回 1日2回 体表面積 1.25m ² 以上~1.50m ² 未満:50mg/回 1日2回 体表面積 1.50m ² 以上:60mg/回 1日2回 |
| 03-008-02 | 胃がん weekly CPT-11(100) | イリノテカン | 100 | mg/m ² | 90分 | 点滴 | 35日 | day1.8.15 | |
| 03-009-02 | 胃がん weekly PTX(80) | ハクリタキセル | 80 | mg/m ² | 60分 | 点滴 | 28日 | day1.8.15 | |
| 03-012-04 | 胃がん CDDP(30)/CPT-11(60) | イリノテカン | 60 | mg/m ² | 90分 | 点滴 | 14日 | day1 | |
| 03-013-05 | 胃がん biweekly CPT-11(150) | シスプラチン イリノテカン | 30 150 | mg/m ² mg/m ² | 90分 90分 | 点滴 点滴 | 14日 | day1 day1 | |
| 03-018-04 | 胃がん CDDP(60)/TS-1(80) | ティーエスワン シスプラチン | 80 60 | mg/m ² mg/m ² | | 内服 点滴 | 35日 | day1-21 day8 | ・TS-1の投与量は、体表面積に応じて以下のとおりとする。 体表面積 1.25m ² 未満:40mg/回 1日2回 体表面積 1.25m ² 以上~1.50m ² 未満:50mg/回 1日2回 体表面積 1.50m ² 以上:60mg/回 1日2回 |
| 03-020-03 | 胃がん weekly PTX(60) / S-1(80) | S-1 ハクリタキセル | 80 60 | mg/m ² mg/m ² | | 内服 点滴 | 28日 | day1-14 day1.8.15 | ・S-1の投与量は、体表面積に応じて以下のとおりとする。 体表面積 1.25m ² 未満:40mg/回 1日2回 体表面積 1.25m ² 以上~1.50m ² 未満:50mg/回 1日2回 体表面積 1.50m ² 以上:60mg/回 1日2回 |
| 03-031-05 | 胃がん 21日 CPT-11(150)/TS-1(80) | イリノテカン ティーエスワン | 150 備考参照 | mg/m ² | 90分 | 点滴 内服 | 21日 | day1 day1-14 | ・TS-1投与量は体表面積により以下のとおりとする 体表面積1.25m ² 未満:40mg/回×2回 体表面積1.25m ² 以上1.5m ² 未満:50mg/回×2回 体表面積1.5m ² 以上:60mg/回×2回 |
| 03-050-01 | 胃がん weekly DTX(25) | ドセタキセル | 25 | mg/m ² | 60分 | 点滴 | 28日 | day1.8.15 | |
| 03-051-01 | 胃がん CDDP(80)/カベシタピン | カベシタピン錠 シスプラチン | 備考参照 80 | mg/m ² | | 内服 点滴 | 21日 | day1-14 day1 | ・カベシタピンの投与量(初回投与量)は、C法に準じて体表面積により以下のとおりとする。 1.36m ² 未満 1200mg×2回 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 1500mg×2回 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 1800mg×2回 1.96m ² 以上 2100mg×2回 |
| 03-052-02 | 胃がん tri weekly Trastuzumab(8/6)/CDDP(80)/Capecitabine(2000) | カベシタピン トラスツズマブ シスプラチン | 備考参照 8 or 6 80 | mg/kg mg/m ² | 90分 | 点滴 | 21日 | day1 day1 | ・トラスツズマブの投与量は初回8mg/kg、2回目以降は6mg/kgとする ・カベシタピンの投与量(初回投与量)は、C法に準じて体表面積により以下のとおりとする。 1.36m ² 未満 1200mg×2回 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 1500mg×2回 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 1800mg×2回 1.96m ² 以上 2100mg×2回 |
| 03-053-01 | 胃がん tri weekly DTX(75) | ドセタキセル | 75 | mg/m ² | 60分 | 点滴 | 21日 | day1 | ・DTXは通常60mg/m ² で使用するが、75mg/m ² まで増量可能 |
| 03-059-03 | 臨床試験 胃がん tri weekly Trastuzumab(8/6)/S-1(80) | S-1 トラスツズマブ | 備考参照 8 or 6 | mg/kg | 90分 | 内服 点滴 | 42日 | day1-28 day1.22 | ・S-1の投与量(初回投与量)は体表面積により以下のとおりとする。 1.25m ² 未満 40mg×2回 1.25m ² 以上1.50m ² 未満 50mg×2回 1.50m ² 以上 60mg×2回 ・トラスツズマブの投与量は初回8mg/kg、2回目以降は6mg/kgとする。 ・トラスツズマブ投与が前日から29日以降となるときは、8mg/kg投与する。 |
| 03-060-02 | 胃小細胞がん CDDP(80)/VP-16(100) | エトポシド シスプラチン | 100 80 | mg/m ² mg/m ² | 2時間 2時間 | 点滴 点滴 | 21日 | day1-3 day1 | |
| 03-061-02 | 胃小細胞がん CDDP(60)/CPT-11(60) | イリノテカン シスプラチン | 60 60 | mg/m ² mg/m ² | 90分 2時間 | 点滴 点滴 | 28日 | day1.8.15 day1 | |
| 03-067-01 | 胃がん tri weekly nab PTX(260) | nab-ハクリタキセル | 260 | mg/m ² | 30分 | 点滴 | 21日 | day1 | |
| 03-080-02 | 胃がん SOX | エスワン オキサリプラチン | 備考参照 100 | mg/m ² | | 内服 点滴 | 21日 | day1-14 day1 | ・エスワンの投与量(初回投与量)は体表面積により以下のとおりとする。 1.25m ² 未満 40mg×2回 1.25m ² 以上1.50m ² 未満 50mg×2回 1.50m ² 以上 60mg×2回 |
| 03-081-02 | 胃がん XELOX | カベシタピン オキサリプラチン | 備考参照 130 | mg/m ² | | 内服 点滴 | 21日 | day1-14 day1 | ・カベシタピンの投与量(初回投与量)は、体表面積により以下のとおりとする。 1.36m ² 未満 1200mg×2回 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 1500mg×2回 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 1800mg×2回 1.96m ² 以上 2100mg×2回 |
| 03-082-01 | 胃がん RAM | ラムシルマブ | 8 | mg/kg | 60分 | 点滴 | 14日 | day1 | |
| 03-083-03 | 胃がん RAM/PTX(80) | ラムシルマブ ハクリタキセル | 8 80 | mg/kg mg/m ² | 60分 60分 | 点滴 点滴 | 28日 | day1.15 day1.8.15 | |
| 03-089-02 | 胃がん weekly nab PTX(100) | nab-ハクリタキセル | 100 | mg/m ² | 30分 | 点滴 | 28日 | day1.8.15 | |
| 03-090-04 | 胃がん ニボルマブ(240) | ニボルマブ | 240 | mg | 30分 | 点滴 | 14日 | day1 | |
| 03-091-01 | 胃がん mFOLFOX6 | レボホリナート オキサリプラチン 5-FU | 200 85 2400 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 2時間 2時間 46時間 | 点滴 点滴 持続点滴 | 14日 | day1 day1-2 day1 | |
| 03-093-03 | 胃がん RAM(8)/nab-PTX(100) | ラムシルマブ nab-ハクリタキセル | 8 100 | mg/kg mg/m ² | 60分 30分 | 点滴 点滴 | 28日 | day1.15 day1.8.15 | |
| 03-097-02 | 胃がん tri weekly Trastuzumab(8/6)/L-OHP(130)/S-1(80) | S-1 トラスツズマブ オキサリプラチン | 備考参照 8 or 6 130 | mg/kg mg/m ² | 90分 | 内服 点滴 | 21日 | day1 day1 | ・トラスツズマブの投与量は初回8mg/kg、2回目以降は6mg/kgとする。 ・S-1の投与量(初回投与量)は体表面積により以下のとおりとする。 1.25m ² 未満 40mg×2回 1.25m ² 以上1.50m ² 未満 50mg×2回 1.50m ² 以上 60mg×2回 |
| 03-098-02 | 胃がん tri weekly Trastuzumab(8/6)/L-OHP(130)/Capecitabine(2000) | カベシタピン トラスツズマブ オキサリプラチン | 備考参照 8 or 6 130 | mg/kg mg/kg mg/m ² | 90分 | 内服 点滴 | 21日 | day1-14 day1 day1 | ・カベシタピンの投与量(初回投与量)は、体表面積により以下のとおりとする。 1.36m ² 未満 1200mg×2回 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 1500mg×2回 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 1800mg×2回 1.96m ² 以上 2100mg×2回 ・トラスツズマブの投与量は初回8mg/kg、2回目以降は6mg/kgとする |
| 03-103-01 | 胃がん ニボルマブ(480) | ニボルマブ | 480 | mg | 30分 | 点滴 | 28日 | day1 | |
| 03-107-01 | 胃がん トラスツズマブ デルクステカン(6.4) | トラスツズマブ ニボルマブ レボホリナート | 6.4 240 200 | mg/kg mg mg/m ² | 90分 30分 2時間 | 点滴 点滴 点滴 | 21日 | day1 day1 day1 | |
| 03-111-01 | 胃がん Nivolumab(240)/mFOLFOX6 | オキサリプラチン 5-FU 5-FU | 85 400 2400 | mg/m ² mg/m ² mg/m ² | 2時間 前日 46時間 | 点滴 点滴 持続点滴 | 14日 | day1 day1 day1-2 | |
| 03-112-01 | 胃がん Nivolumab(360)/SOX | ニボルマブ エスワン オキサリプラチン | 360 備考参照 100 | mg mg/m ² mg/m ² | 30分 | 点滴 内服 点滴 | 21日 | day1 day1-14 day1 | ・エスワンの投与量(初回投与量)は体表面積により以下のとおりとする。 1.25m ² 未満 40mg×2回 1.25m ² 以上1.50m ² 未満 50mg×2回 1.50m ² 以上 60mg×2回 |
| 03-113-01 | 胃がん Nivolumab(360)/XELOX | カベシタピン オキサリプラチン | 備考参照 130 | mg/m ² | | 内服 点滴 | 21日 | day1-14 day1 | ・カベシタピンの投与量(初回投与量)は、体表面積により以下のとおりとする。 1.36m ² 未満 1200mg×2回 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 1500mg×2回 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 1800mg×2回 1.96m ² 以上 2100mg×2回 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|------------|-------------------|--------|------|-----|----------------------|---|
| 03-120-01 | 胃がん RAM(8)/CPT-11(150) | ラムシルマブ | 8 | mg/kg | 60分 | 点滴 | 14日 | day1 | |
| | | イリノテカン | 150 | mg/m ² | 90分 | 点滴 | | day1 | |
| 03-128-01 | 胃がん Trastuzumab(8/6)/mFOLFOX6 | トラスツズマブ | 8 or 6 | mg/kg | 90分 | 点滴 | | day1.22 | ・トラスツズマブの投与量は初回8mg/kg、2回目以降は6mg/kgとする。 |
| | | レボホリナート | 200 | mg/m ² | 2時間 | 点滴 | | day1.15.29 | |
| | | オキサリプラチン | 85 | mg/m ² | 2時間 | 点滴 | | day1.15.29 | |
| | | 5-FU | 400 | mg/m ² | 全開 | 点滴 | | day1.15.2 | |
| | | 5-FU | 2400 | mg/m ² | 46時間 | 持続点滴 | | day1-2, 15-16, 29-30 | |
| 03-138-02 | 胃がん Zolbetuximab(800/400)/mFOLFOX6 | ゾルベツキシマブ | 800 or 400 | mg/m ² | | 点滴 | | day1 | ・ゾルベツキシマブの投与量は初回800mg/m ² 、2回目以降400mg/m ² を投与する。 |
| | | レボホリナート | 200 | mg/m ² | 2時間 | 点滴 | | day1 | |
| | | オキサリプラチン | 85 | mg/m ² | 2時間 | 点滴 | | day1 | |
| | | 5-FU | 400 | mg/m ² | 全開 | 点滴 | | day1-2 | |
| | | 5-FU | 2400 | mg/m ² | 46時間 | 持続点滴 | | day1-2 | |
| 03-139-02 | 胃がん Zolbetuximab(800/600)/XELOX | カベシタピン | 備考参照 | | | 内服 | | day1-14 | ・カベシタピンの投与量(初回投与量)は、体表面積により以下のとおりとする。 1.36m ² 未満 1200mg×2回 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 1500mg×2回 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 1800mg×2回 1.96m ² 以上 2100mg×2回 ・ゾルベツキシマブの投与量は初回800mg/m ² 、2回目以降600mg/m ² を投与する。 |
| | | ゾルベツキシマブ | 800 or 600 | mg/m ² | 添付文書参照 | 点滴 | 21日 | day1 | |
| | | オキサリプラチン | 130 | mg/m ² | 2時間 | 点滴 | | day1 | |
| 03-142-01 | 臨床試験 胃がん Zolbetuximab(800/600)/SOX | S-1 | 80 | mg/m ² | | 内服 | | day1-14 | ・エスワンの投与量(初回投与量)は体表面積により以下のとおりとする。 1.25m ² 未満 40mg×2回 1.25m ² 以上1.50m ² 未満 50mg×2回 1.50m ² 以上 60mg×2回 ・ゾルベツキシマブの投与量は初回は、800mg/m ² 、2回目以降600mg/m ² を投与する。 |
| | | ゾルベツキシマブ | 800 or 600 | mg/m ² | 添付文書参照 | 点滴 | 21日 | day1 | |
| | | オキサリプラチン | 130 | mg/m ² | 2時間 | 点滴 | | day1 | |
| 03-143-01 | 胃がん Pembrolizumab(200)/XELOX | カベシタピン | 備考参照 | | | 内服 | | day1-14 | ・カベシタピンの投与量(初回投与量)は、体表面積により以下のとおりとする。 1.36m ² 未満 1200mg×2回 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 1500mg×2回 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 1800mg×2回 1.96m ² 以上 2100mg×2回 |
| | | ペムブロリズマブ | 200 | mg | 30分 | 点滴 | 21日 | day1 | |
| | | オキサリプラチン | 130 | mg/m ² | 2時間 | 点滴 | | day1 | |
| 03-144-01 | 胃がん Pembrolizumab(200)/CDDP(80)/5-FU(800) | ペムブロリズマブ | 200 | mg | 30分 | 点滴 | 21日 | day1 | |
| | | シスプラチン | 80 | mg/m ² | 2時間 | 点滴 | | day1-5 | |
| | | 5-FU | 800 | mg/m ² | 24時間 | 持続点滴 | | day1-5 | |
| 03-148-01 | 胃がん Pembrolizumab(200)/Trastuzumab(8/6)/CDDP(80)/5-FU(800) | ペムブロリズマブ | 200 | mg | 30分 | 点滴 | 21日 | day1 | ・トラスツズマブの投与量は初回8mg/kg、2回目以降は6mg/kgとする。 |
| | | トラスツズマブ | 8 or 6 | mg/kg | 90分 | 点滴 | | day1 | |
| | | シスプラチン | 80 | mg/m ² | 2時間 | 点滴 | | day1-5 | |
| | | 5-FU | 800 | mg/m ² | 24時間 | 持続点滴 | | day1-5 | |
| 03-149-01 | 胃がん Pembrolizumab(200)/Trastuzumab(8/6)/CAPOX | カベシタピン | 備考参照 | | | 内服 | | day1-14 | ・カベシタピンの投与量(初回投与量)は、体表面積により以下のとおりとする。 1.36m ² 未満 1200mg×2回 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 1500mg×2回 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 1800mg×2回 1.96m ² 以上 2100mg×2回 ・トラスツズマブの投与量は初回8mg/kg、2回目以降は6mg/kgとする。 |
| | | ペムブロリズマブ | 200 | mg | 30分 | 点滴 | 21日 | day1 | |
| | | トラスツズマブ | 8 or 6 | mg/kg | 90分 | 点滴 | | day1 | |
| | | オキサリプラチン | 130 | mg/m ² | 2時間 | 点滴 | | day1 | |